



骨粗しょう症便り Vol.3

骨粗しょう症治療薬とは!?







骨粗しょう症治療薬の作用は、カルシウムの補充や骨の代謝を調整することです。

骨吸収を抑制したり、骨形成を促進することで骨の代謝のバランスを調整します。治療は年単位で継続が必要ですので根気よく続けることが大事になります。悩みや困りごとなどがあればすぐに申し出てください。

裏面に当院で取り扱っている薬剤を紹介しています。




内服剤

カルシウムの補充	カルシウムの吸収を促進させる	
毎日服用	毎日服用	
アスパラCA®錠 	アルファカルシドール錠 	エディロール®カプセル 

ホルモン関連薬	骨吸収を抑制する	
毎日服用	週1回服用	月1回服用
ビビアント®錠 	アレンドロン酸錠 	ポノテオ®錠 

注射剤

骨形成を促進する		骨吸収抑制と骨形成促進
週2回自己注射	週1回病院で注射	月1回病院で注射 (2本/回)
テリボン®皮下注AI 	テリボン®皮下注 	イベニティ®皮下注 

骨吸収を抑制する		
年1回病院で注射	半年に1回病院で注射	月1回病院で注射
リクラスト®点滴静注液 	プラリア®皮下注 	ボンビバ®静注 

骨粗しょう症治療薬には様々なタイプの薬があります。ご不明な点や気になることがあれば医療スタッフへご相談ください。



社会医療法人美杉会
男山病院 整形外科

八幡市男山泉19

☎075-983-0001(代表)

<http://misugikai.jp/otokoyama/>