

## 食道癌 化学療法レジメン 目次

No.901	FP	No.941	
No.902	FP+RT	No.942	
No.903		No.943	
No.904		No.944	
No.905		No.945	
No.906		No.946	
No.907		No.947	
No.908		No.948	
No.909		No.949	
No.910		No.950	
No.911		No.951	
No.912		No.952	
No.913		No.953	
No.914		No.954	
No.915		No.955	
No.916		No.956	
No.917		No.957	
No.918		No.958	
No.919		No.959	
No.920		No.960	
No.921		No.961	
No.922		No.962	
No.923		No.963	
No.924		No.964	
No.925		No.965	
No.926		No.966	
No.927		No.967	
No.928		No.968	
No.929		No.969	
No.930		No.970	
No.931		No.971	
No.932		No.972	
No.933		No.973	
No.934		No.974	
No.935		No.975	
No.936		No.976	
No.937		No.977	
No.938		No.978	
No.939		No.979	
No.940		No.980	

## No.901 FP療法(入院)

《対象》食道癌 術前もしくは進行再発

1サイクル:4週

術前は3週に1回を2サイクル

手術可能・再発は4週に1回をエンドレス投与

**※シスプラチン合計600mg~1000mgを超えると腎機能障害に注意**

**※入院前の外来診察時にアプレピタント125mgの処方をお忘れしないこと**

- |   |   |                           |  |
|---|---|---------------------------|--|
| ① | 生食<br>5FU(250mg,1000mg)                             | 500ml<br>_____mg          | [800mg/m <sup>2</sup> ]<br>※ただしシスプラチン投与中は止め<br>①のみ24時間持続をDay1~5(5日間) |
| ② | ポタコール<br>パロノセトロン(0.75mg)<br>フロセミド(20mg)             | 500ml<br>1V<br>1/2A       | ①の側管 2時間   |
| ③ | 生食<br>メトクロプラミド(10mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>フロセミド(20mg) | 500ml<br>2A<br>1V<br>1/2A | ①の側管 3時間   |
| ④ | アプレピタント(125mg)                                      | 1cap                      | シスプラチン投与の1時間前に   |
| ⑤ | 生食<br>シスプラチン(10mg・50mg)                             | 500ml<br>_____mg          | ①の側管 2時間<br>[80mg/m <sup>2</sup> ]<br>※投与中①中止                        |
| ⑥ | 生食<br>メトクロプラミド(10mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>フロセミド(20mg) | 500ml<br>2A<br>1V<br>1/2A | ①の側管 2時間<br>※①再開   |
| ⑦ | 生食  | 100ml                     | 10分  |

【内服】 Day 2~3:アプレピタント(80mg) 1cap

## No.902 FP+RT療法(入院)

《対象》食道癌 + 根治的化学放射線療法

1サイクル:4週 2サイクル実施

奏効時、FP療法を2サイクル追加

**※シスプラチン合計600mg~1000mgを超えると腎機能障害に注意**

**※入院前の外来診察時にアプレピタント125mgの処方をお忘れしないこと**

- ① 生食 500ml  
5FU(250mg,1000mg) \_\_\_\_\_mg [700mg・1000mg/m<sup>2</sup>]  
\* stage別  
※ただしシスプラチン投与中は止め  
①のみ24時間持続をDay1~5(5日間)
- ② ポタコール 500ml ①の側管 2時間  
パロノセトロン(0.75mg) 1V  
フロセミド(20mg) 1/2A
- ③ 生食 500ml ①の側管 3時間  
メトクロプラミド(10mg) 2A  
デキサート(6.6mg) 1V  
フロセミド(20mg) 1/2A
- ④ アプレピタント(125mg) 1cap シスプラチン投与の1時間前に
- ⑤ 生食 500ml ①の側管 2時間  
シスプラチン(10mg・50mg) \_\_\_\_\_mg [70mg・75mg/m<sup>2</sup>]  
※投与中①中止 \* stage別
- ⑥ 生食 500ml ①の側管 2時間  
メトクロプラミド(10mg) 2A  
デキサート(6.6mg) 1V  
フロセミド(20mg) 1/2A  
※①再開
- ⑦ 生食 100ml 10分

【内服】 Day 2~3:アプレピタント(80mg) 1cap

* ①	シスプラチン	5FU
stage I	70mg/m <sup>2</sup>	700mg/m <sup>2</sup>
stage II・III	75mg/m <sup>2</sup>	1000mg/m <sup>2</sup>
stage III(T4)・IV	70mg/m <sup>2</sup>	700mg/m <sup>2</sup>

2020/4/17改訂

2021/9/7改訂