

泌尿器癌 化学療法レジメン 目次

No.401	オプジーボ療法	No.441	
No.402	オプジーボ・ヤーボイ併用療法	No.442	
No.403	ドセタキセル単独療法	No.443	
No.404		No.444	
No.405		No.445	
No.406		No.446	
No.407		No.447	
No.408		No.448	
No.409		No.449	
No.410		No.450	
No.411		No.451	
No.412		No.452	
No.413		No.453	
No.414		No.454	
No.415		No.455	
No.416		No.456	
No.417		No.457	
No.418		No.458	
No.419		No.459	
No.420		No.460	
No.421		No.461	
No.422		No.462	
No.423		No.463	
No.424		No.464	
No.425		No.465	
No.426		No.466	
No.427		No.467	
No.428		No.468	
No.429		No.469	
No.430		No.470	
No.431		No.471	
No.432		No.472	
No.433		No.473	
No.434		No.474	
No.435		No.475	
No.436		No.476	
No.437		No.477	
No.438		No.478	
No.439		No.479	
No.440		No.480	

No.401 オプジーボ単独療法

≪対象≫根治切除不能又は転移性の腎細胞癌(二次治療以降)

1サイクル:2週

【A】をDay1に投与

開始前と治療継続中は定期的に内分泌機能検査(TSH、FT3、FT4、ACTH、コルチゾール等)が必須

【A】	①	生食	100 ml	
		オプジーボ(240mg/24ml) ※フィルター使用	240mg/body	30分
	②	生食	100ml	10分

※ 投与時にInfusion reactionが出現した際は、次回オプジーボ投与のとき
抗ヒスタミン薬やアセトアミノフェン、ステロイドの前投薬を考慮する

2019/8/1作成
2020/11/27改訂
2021/3/4改訂

No.402 オプジーボ + ヤーボイ併用療法

《対象》化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

【A】1サイクル:3週 Day1に投与 4サイクル実施

【B】1サイクル:2週 Day1に投与 (【A】を4サイクル実施3週後に開始)

開始前と治療継続中は定期的に内分泌機能検査(TSH、FT3、FT4、ACTH、コルチゾール等)が必須

【A】	①	生食	100 ml	30分
		オプジーボ(240mg/24ml)	240mg/body	
		※フィルター使用		
	②	生食フラッシュ		
【B】	③	生食	50 ml	30分
		ヤーボイ(50mg/10ml)	_____mg	
		※フィルター使用		
	④	生食	100ml	10分
【B】	①	生食	100 ml	30分
		オプジーボ(240mg/24ml)	240mg/body	
		※フィルター使用		
	②	生食	100ml	10分

※ 投与時にInfusion reactionが出現した際、
抗ヒスタミン薬やアセトアミノフェン、ステロイドの前投薬を考慮する

2020/11/27作成

2021/3/4改訂

2021/9/7改訂

No.403 ドセタキセル単独療法

≪対象≫ 不応性前立腺癌

1サイクル:2週

【A】をDay1に投与

【A】	①	5%ブドウ糖注射液	250 ml	60分
		ドセタキセル(20mg)	<u>20 mg/body</u>	
	②	生食	100 ml	10分

2022/1/22作成
2022/11/4改訂