



社会医療法人
美杉会

男山病院

骨粗鬆症便り Vol.10

骨密度が低下すると…

圧迫骨折する可能性が高まります！

圧迫骨折とは、腰椎の椎体という部分に外から圧力が加かって起きる骨折のことです。骨密度が低下していると、尻もちをついた、転倒した、重いものを持ち上げた時などふとしたきっかけで引き起こすことがあります。



圧迫骨折前



圧迫骨折後

骨密度の低下は治療できます！

まずは検査をして自分の骨密度を把握しましょう！

どんな検査なの？

- **腰椎と股関節**の骨密度を測定！
- 検査時間は **10分**程度！
- **低被ばく**で安心な検査！



☆ 検査時の注意点

金属、ボタンがついている洋服は検査に支障があるため着替えが必要となりますので、検査当日はなるべく金属やボタンが付いていない洋服で来院されるようよろしくお願い致します。

検査を受けていただいた方に結果用紙をお渡ししています。

詳しい検査結果用紙の見方についてご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

2023年4月より骨粗鬆症相談室を開設しました。

相談は無料です。ご希望の方は地域連携室にお声掛けください。



社会医療法人美杉会
男山病院 整形外科

八幡市男山泉19

☎075-983-0001 (代表)

<http://misugikai.jp/otokoyama/>