

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
大腸01	FOLFIRI	イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群						
大腸02	CPT-11	イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	14日
主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛								
大腸03	FOLFIRI+BV	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嗜血								
大腸04	FOLFIRI+パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症								
大腸05	FOLFIRI+ラムシルマブ	ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、尿蛋白								
大腸06	FOLFOX	オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群						
大腸07	FOLFOX+BV	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嗜血								
大腸08	FOLFOX+パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症								
大腸09	FOLFOXIRI	イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	2400~3200	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群						
大腸10	FOLFOXIRI+B V	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	2400~3200	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嗜血								
大腸11	IRIS+B V	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1、15	28日
		イリノテカン	125	mg/m ²	90分	点滴	Day1、15	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嗜血								
大腸12	IRIS	イリノテカン	125	mg/m ²	90分	点滴	Day1、15	28日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、						
大腸13	SOX+B V	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、皮膚障害、悪心・嘔吐、過敏症、末梢神経障害、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嗜血						

大腸14	XELOX+B V	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		カベシタピン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、過敏症、末梢神経障害、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嘔血								
大腸15	XELOX	オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		カベシタピン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、過敏症、末梢神経障害						
大腸16	かべシズマブ+BV	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	21日
		カベシタピン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：手足症候群、下痢、悪心・口内炎、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嘔血						
大腸17	かべシズマブ+IRI+BV	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	21日
		イリノテカン	200	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		カベシタピン	1600	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、脱毛、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嘔血								
大腸18	パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症						
大腸19	セクシマブ+インテリニブ+ビニチニブ	セクシマブ	250 (初回 400)	mg/m ²	60分 (初回 120分)	点滴	Day1	7日
		インテリニブ	300	mg/day	1日1回	内服	Day1-7	
		ビニチニブ	90	mg/day	1日2回	内服	Day1-7	
主な副作用：下痢、悪心・嘔吐、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症、皮膚悪性腫瘍、手掌・足底発赤知覚不全症候群、眼症状、心機能障害、横紋筋融解症、高血圧、出血								
大腸20	セクシマブ+インテリニブ	セクシマブ	250 (初回 400)	mg/m ²	60分 (初回 120分)	点滴	Day1	7日
		インテリニブ	300	mg/day	1日1回	内服	Day1-7	
		主な副作用：下痢、悪心・嘔吐、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症、皮膚悪性腫瘍、手掌・足底発赤知覚不全症候群、眼症状						
大腸21	CPT-11+パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症						
大腸22	sLV5FU2+ペバシズマブ	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1	
主な副作用：下痢、口内炎、骨髄抑制、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嘔血								
大腸23	TAS-102+BV	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1、15	28日
		トリフルリジン・チピラシル	70	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-5、8-12	
		主な副作用：骨髄抑制、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、嘔血						
大腸24	ベムプロリズマブ 3週間	ベムプロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						