

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
膵01	modified FOLFIRINOX (ﾌﾌ' ﾚ' ﾉﾄ)	オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎						
膵02	modified FOLFIRINOX (ﾌﾌ' ﾚ' ﾉﾄ)	オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎						
膵03	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	21日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：血管痛、発熱、間質性肺炎、下痢、口内炎						
膵04	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	28日
主な副作用：血管痛、発熱、間質性肺炎								
膵05	GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	28日
		パクリタキセル アルブミン懸濁型	125	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：末梢神経障害、脱毛、間質性肺炎、脳神経麻痺、黄斑浮腫						
膵06	nal-IRI+5-FU+I-LV	イリノテカン リポソーム製剤	50 or 70	mg/m ²	90分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、悪心・嘔吐						
胆道01	GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	21日
		シスプラチン	25	mg/m ²	120分	点滴	Day1、8	
		主な副作用：腎障害、神経障害、脱毛						
胆道02	GEM+CDDP+S-1	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1	14日
		シスプラチン	25	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1-7	
		主な副作用：下痢、口内炎、腎障害、悪心・嘔吐、末梢神経障害・聴器障害、間質性肺炎、発熱						
胆道03	GEM+CDDP+デュルバルマブ	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	21日
		シスプラチン	25	mg/m ²	120分	点滴	Day1、8	
		デュルバルマブ	1500	mg/body	60分	点滴	Day1	
		主な副作用：口内炎、腎障害、悪心・嘔吐、末梢神経障害・聴器障害、発熱、間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
胆道04	デュルバルマブ (維持療法)	デュルバルマブ	1500	mg/body	60分	点滴	Day1	28日
主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症								
胆道05	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	21日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	60-100	mg/day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用：血管痛、発熱、間質性肺炎、下痢、口内炎						
肝01	アテゾリズマブ+ペバシズマブ	アテゾリズマブ	1200	mg/body	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	21日
		ペバシズマブ	15	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、咯血						