

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
尿路上皮01	ベムプロリズマブ 3週間	ベムプロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
尿路上皮02	ベムプロリズマブ 6週間	ベムプロリズマブ	400	mg/body	30分	点滴	Day1	42日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
尿路上皮03	CG (CBDCA+GEM)	カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ゲムシタピン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	
		主な副作用：発熱、間質性肺炎						
尿路上皮04	GC (GEM+CDDP)	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	28日
		シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	点滴	Day2	
		主な副作用：腎障害、神経障害、脱毛						
尿路上皮05	エンホルツマブ・ベドチン	エンホルツマブ・ベドチン	1.25	mg/kg	30分	点滴	Day1、8、15	28日
		主な副作用：皮膚障害、末梢性ニューロパチー、疲労、食欲減退、脱毛症						
尿路上皮06	アベルマブ	アベルマブ	10	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
腎細胞01	ニボルマブ 2週間	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
腎細胞02	ニボルマブ+イビリムマブ	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		イビリムマブ	1	mg/kg	30分	点滴	Day1	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
腎細胞03	ベムプロリズマブ+アキシチニブ	ベムプロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		アキシチニブ	10	mg/day	1日2回	内服	連日	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症、高血圧、手足症候群						
腎細胞04	アベルマブ+アキシチニブ	アベルマブ	10	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		アキシチニブ	10	mg/day	1日2回	内服	連日	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質低下症、高血圧、手足症候群						
腎細胞05	ニボルマブ+カボザンチニブ	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		カボザンチニブ	40	mg/day	1日1回	内服	連日	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質低下症、高血圧、手足症候群						