

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール	
食道01	FP	5-FU	800	mg/m ²	24時間	点滴	Day1-5	28日 (術前 21日)	
		シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点滴	Day1		
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害							
食道02	FP+RT	5-FU	700~1000	mg/m ²	24時間	点滴	Day1-4	28日	
		シスプラチン	70~75	mg/m ²	2時間	点滴	Day1		
		*放射線治療は、総線量50.4~60Gyを分割（Day 1-5、Day 8-12、Day 15-19、Day 22-26、Day 29-33、Day 36-38）							
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、嚥下障害、粘膜炎、皮膚障害							
食道03	weekly PTX	パクリタキセル	100	mg/m ²	60分	点滴	Day1、8、15、22、29、36	49日	
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、関節痛・筋肉痛、脱毛							
食道04	DTX	ドセタキセル	70	mg/m ²	60分	点滴	Day1	21日	
		主な副作用：アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛							
食道05	FP+ベムプロリズマブ	ベムプロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日	
		5-FU	800	mg/m ²	24時間	点滴	Day1-5		
		シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点滴	Day1		
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症							
食道06	FP+ニボルマブ	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日	
		5-FU	800	mg/m ²	24時間	点滴	Day1-5		
		シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点滴	Day1		
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症							
食道07	ニボルマブ 2週間	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症							
食道08	ニボルマブ 4週間	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症							
食道09	DCF	5-FU	750	mg/m ²	24時間	点滴	Day1-5	21日	
		ドセタキセル	70	mg/m ²	60分	点滴	Day1		
		シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	点滴	Day1		
		主な副作用：骨髄抑制、悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、脱毛、粘膜炎							