

がん薬物療法(全般)



服薬情報提供書(大阪版)

処方医	科	先生	保険	名称	
患者ID			局	住所	
患者名				TEL	
				FAX	
患者同意	<input type="checkbox"/> 同意を得た。	<input type="checkbox"/> 同意は得ていないが、治療上重要と考えるため報告します。		担当薬剤師	

確認日	年 月 日	対応者	<input type="checkbox"/> 本人	<input type="checkbox"/> 家族	<input type="checkbox"/> その他 ()
レジメン・薬剤名		確認方法	<input type="checkbox"/> 投薬時	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> テレフォンフォロー時
					<input type="checkbox"/> 患者からの問合せ時

発熱 (37.5度以上)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	呼吸困難、息切れ、咳嗽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
感染症様症状 (喉の痛み、排尿時痛など)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	重篤な出血 (消化管出血・血尿・咯血など)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり

受診勧奨の実施 なし あり → 上記症状のため Grade3以上のため 休薬が必要と思われたため

(※) 皮膚科・腫瘍内科コンサルト会議

有害事象 [CTCAE v 5.0]	Grade1 (軽症*)	Grade2 (中等症*)	Grade3 (重症*)
下痢	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> ベースラインと比べて4回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度増加	<input type="checkbox"/> 7回/日以上排便回数増加; 入院を要する; 人工肛門からの排泄量の高度増加; 身の回りの日常生活動作の制限
便秘	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 不定期または間欠的な症状; 便軟化薬/緩下剤/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	<input type="checkbox"/> 排便を要する頑固な便秘; 身の回りの日常生活動作の制限
悪心	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 摂食習慣に栄養のない食欲低下	<input type="checkbox"/> カロリーや水分の経口摂取が不十分; 経管栄養/TPN/入院を要する
嘔吐	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 治療を要さない	<input type="checkbox"/> 経管栄養/TPN/入院を要する
食欲不振	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 摂食習慣の変化を伴わない食欲低下	<input type="checkbox"/> 顕著な体重減少または栄養失調を伴う(例: カロリーや水分の経口摂取が不十分); 静脈内輸液/経管栄養/TPN 要する
口腔粘膜炎	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状がない、または軽度の症状; 治療を要さない	<input type="checkbox"/> 高度の疼痛; 経口摂取に支障がある
末梢神経障害 (末梢性ニューロパチ)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状がない(臨床所見または検査所見のみ)	<input type="checkbox"/> 高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限
倦怠感	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> だるさがある、または元気がない	<input type="checkbox"/> 身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態
高血圧 : 成人	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 収縮期血圧(sBP)120-139 mmHgまたは拡張期血圧(dBP)80-89 mmHg	<input type="checkbox"/> sBP≥160またはdBP≥100; 2種類以上の薬物治療または以前よりも強い治療を要する
手足症候群 (※)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 手掌、足底に違和感があり、発赤はないが、わずかに見られ、疼痛はなく、日常生活の作業に差し支えない	<input type="checkbox"/> 手掌、足底に発赤が著明で、大型の水疱がみられ、強い疼痛を常に感じ、日常生活の作業が行いづらく、歩行しづらい
ざ瘡様皮疹 (※)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 顔面を中心に全体で20個前後の丘疹、膿疱を認める。疼痛、そう痒はない。日常生活は気にならない	<input type="checkbox"/> 顔面、躯幹、四肢に全体で100個前後の丘疹、膿疱を認める。疼痛、そう痒を常に感じる。他人との面会が億劫である
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

疼痛(部位・NRS・コントロールの状況など)、症状の詳細、指導内容、提案事項、その他

病院記載欄	返信日	年 月 日
<input type="checkbox"/> 報告内容を確認しました。	<input type="checkbox"/> 報告内容を確認し、処方医へ報告しました。	病院名
<input type="checkbox"/> 提案内容を医師へ伝えました。	<input type="checkbox"/> 次回受診時・診察前面談時に検討します。	
<input type="checkbox"/> その他 ()	薬剤師	

【 その他 (3項目選択可能) 】

味覚異常	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 食生活の変化を伴わない味覚変化	<input type="checkbox"/> 食生活の変化を伴う味覚変化(例：経口サプリメント);不快な味;味の消失	
皮膚乾燥 (※)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 体表面積(BSA) < 10%を占め、紅斑やそう痒は伴わない	<input type="checkbox"/> BSA10-30%を占め、紅斑またはそう痒を伴う;身の回り以外の日常生活動作の制限	<input type="checkbox"/> BSA > 30%を占め、そう痒を伴う;身の回りの日常生活動作の制限
そう痒 (※)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度または限局性;局所的治療を要する	<input type="checkbox"/> 広範囲かつ間欠性;掻破による皮膚の変化;内服治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限	<input type="checkbox"/> 広範囲かつ常時;身の回りの日常生活動作や睡眠の制限;副腎皮質ステロイドの全身投与または免疫抑制療法を要する
爪囲炎 (※)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 爪襞の浮腫や紅斑;角質の剥脱	<input type="checkbox"/> 局所的治療や内服治療を要する;疼痛を伴う爪襞の浮腫や紅斑;滲出液や爪の分離;身の回り以外の日常生活動作の制限	<input type="checkbox"/> 外科的処置を要する;抗菌薬の静脈内投与を要する;身の回りの日常生活動作の制限
皮疹 (斑状丘疹状皮疹)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状の有無は問わない(例: そう痒, 熱感, ひきつれ);体表面積(BSA) < 10%を占める斑状疹/丘疹	<input type="checkbox"/> 症状の有無問わない, BSA10-30%の斑状疹/丘疹;身の回り以外の日常生活動作の制限;BSA > 30%を占める皮疹	<input type="checkbox"/> 中等度/高度の症状を伴う, BSA > 30%を占める斑状疹/丘疹;身の回りの日常生活動作の制限
蕁麻疹	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 体表面積(BSA) < 10%を占める蕁麻疹;局所治療を要する	<input type="checkbox"/> BSA10-30%を占める蕁麻疹;内服治療を要する	<input type="checkbox"/> BSAの > 30%を占める蕁麻疹;静脈内投与による治療を要する
湿疹	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状がない, または軽度の症状; ベースラインを超える内科的治療の追加を要さない	<input type="checkbox"/> 中等度;外用薬または内服治療を要する;ベースラインを超える内科的治療の追加を要する	<input type="checkbox"/> 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない;静脈内投与による治療を要する
浮腫 (全身性浮腫)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 診察で明らか; 1+の圧痕浮腫	<input type="checkbox"/> 身の回り以外の日常生活動作に支障がある;内服治療を要する	<input type="checkbox"/> 身の回りの日常生活動作に支障がある;静脈内投与による治療を要する;皮膚の離開
疲労	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 休息により軽快する疲労	<input type="checkbox"/> 休息によって軽快しない疲労;身の回り以外の日常生活動作の制限	<input type="checkbox"/> 休息によって軽快しない疲労で, 身の回りの日常生活動作の制限を要する