	1 25 20.25	並 5 4	10. ⊢ ==	327 AL	10. F p+ ***	+/2 ← ·	10. F. C	-
レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日 Day1	クール
膵01		オキサリプラチン	85	mg/m²	120分	点滴	Day1	1
		レボホリナート	200	mg/m²	120分	点滴	Day1	14日
	modified FOLFIRINOX(アプレピタント)	イリノテカン	150	mg/m²	90分 46時間	点滴	Day1	1
		5-FU 主な副作用:過敏症、末梢神経障害、下痢、悪心・嘔吐、l	2400	mg/mi	40时间	持続	Day1-3	
		土な町TF州・旭駅址、木侑作駐岸台、「炯、恋心・ໝ生、加	元七、口內炎					
		オキサリプラチン	85	mg/m²	120分	点滴	Day1	
		レポホリナート	200	mg/m²	120分	点滴	Day1	
	III I FOI FIDINGY (ISSEE III FIL)	イリノテカン	150	mg/m²	90分	点滴	Day1	14日
膵02	modified FOLFIRINOX (ቱአፖፓ' ኦቲ' ጵኦት)	5-FU	2400	mg/m²	46時間	持続	Day1-3	Ť
		主な副作用:過敏症、末梢神経障害、下痢、悪心・嘔吐、肝	兑毛、口内炎					•
					1	T ===		
膵03	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000	mg/mi	30分	点滴	Day1、8	21日
		テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m²/day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用:血管痛、発熱、間質性肺炎、下痢、口内炎						
		ゲムシタビン	1000	ma/m²	20/\	点滴	Day1 9 15	28日
膵04	GEM	・ 主な副作用:血管痛、発熱、間質性肺炎	1000	mg/m²	30分	从周	Day1、8、15	201
<i>II</i> -0 1	3-111	土な副TF用・皿官網、光然、同員吐加欠						
		ゲムシタビン	1000	mg/m²	30分	点滴	Day1、8、15	** -
D# 0.F	0511	パクリタキセル アルブミン懸濁型	125	mg/m²	30分	点滴	Day1、8、15	28日
膵05	GEM+nab-PTX	主な副作用:末梢神経障害、脱毛、間質性肺疾患、脳神経腫			00%	711110		
		イリノテカン リポソーム製剤	50 or 70	mg/m²	90分	点滴	Day1	T
膵06		レボホリナート	200	mg/m²	120分	点滴	Day1	14日
	nal-IRI+5-FU+I-LV	5-FU	2400	mg/m²	46時間	持続	Day1-3	1711
21		主な副作用:下痢、骨髄抑制、悪心・嘔吐	2400	IIIg/ III	401/10	1-19/6	Day1-3	
		土な町下州・下州、育鵬が中川、恋心・世上						
		ゲムシタビン	1000	mg/m²	30分	点滴	Day1、8	
胆道01	GEM+CDDP	シスプラチン	25	mg/m²	120分	点滴	Day1、8	21日
		主な副作用:腎障害、神経障害、脱毛			120%	YILAN	50,1(5	1
		ゲムシタビン	1000	mg/m²	30分	点滴	Day1	
胆道02		シスプラチン	25	mg/m²	120分	点滴	Day1	14日
	GEM+CDDP+S-1	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m²/day	1日2回	内服	Day1-7	<u> </u>
		主な副作用:下痢、口内炎、腎障害、悪心・嘔吐、末梢神紅	経障害・聴器障害、間質性別	市炎、発熱				
		hi 1 2 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /	1000	ma er / met	20/\	上法	Davit 0	
胆道03		ゲムシタビン	1000	mg/m²	30分	点滴	Day1、8	21.0
	GEM+CDDP+デュルバルマブ	シスプラチン	25	mg/m²	120分	点滴	Day1、8	21日 低下症
		デュルバルマブ 主な副作用:口内炎、腎障害、悪心・嘔吐、末梢神経障害	1500 ・聴器障害、発熱、間質性肺	mg/body 肺炎、大腸炎、i	60分 重度の下痢、 型糖尿	点滴 点滴 点滴 表演、甲状腺機能	Day1 障害、副腎皮質機能	
	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500	mg/body	60分	点滴	Day1	28日
胆道04	(維持療法)	主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
		ゲムシタビン	1000	mg/m²	30分	点滴	Day1、8	21日
胆道05	GEM+S-1	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	60~100	mg/day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用:血管痛、発熱、間質性肺炎、下痢、口内炎						
		アテゾリズマブ	1200	mg/body	30分	点滴	Day1	
					(初回 60分)			21.0
肝01	アテゾリズマブ+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15		30分	F:#	D 1	21日
11101		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	15	mg/kg	(初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀						
		トレメリムマブ	300	mg/body	60分	点滴	Day1	単回投与
				ma er /la a el	60分	点滴	Day1	+6187
肝02	トレメリムマブ+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500		0073	Allen	Duyi	
肝02	トレメリムマブ+デュルバルマブ	デュルバルマプ 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿科			007)	Altae	Dayı	
肝02	トレメリムマブ+デュルバルマブ				00))	ANA	Dayı	
肝02 肝03	トレメリムマブ+デュルバルマブ デュルバルマブ		5、甲状腺機能障害、副腎皮 1500	g質機能低下症 mg/body	60分	点滴	Day1	28日