

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
大腸01	FOLFIRI	イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群						
大腸02	CPT-11	イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛						
大腸03	FOLFIRI+BV	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血						
大腸04	FOLFIRI+パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症						
大腸05	FOLFIRI+ラムシルマブ	ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白						
大腸06	FOLFOX	オキサリプラチン	85	mg/㎡	120分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群						
大腸07	FOLFOX+BV	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血						
大腸08	FOLFOX+パニツムマブ	パニツムマブ	6	mg/kg	60分	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/㎡	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症						
大腸09	FOLFOXIRI	イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	2400～3200	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群						
大腸10	FOLFOXIRI+ B V	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	14日
		イリノテカン	150	mg/㎡	90分	点滴	Day1	
		オキサリプラチン	85	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡	120分	点滴	Day1	
		5-FU	2400～3200	mg/㎡	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血						
大腸11	IRIS+ B V	ペバシズマブ	5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1、15	28日
		イリノテカン	125	mg/㎡	90分	点滴	Day1、15	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/㎡/day	1日2回	内服	Day1～14	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血						
大腸12	IRIS	イリノテカン	125	mg/㎡	90分	点滴	Day1、15	28日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/㎡/day	1日2回	内服	Day1～14	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、						
大腸13	SOX+ B V	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/㎡	120分	点滴	Day1	

