

| レジメンNo. | レジメン名          | 薬品名                                                                    | 投与量       | 単位       | 投与時間                         | 投与ルート | 投与日     | クール |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-------|---------|-----|
| 大腸01    | FOLFIRI        | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群                                             |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸02    | CPT-11         | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛                                                       |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸03    | FOLFIRI+BV     | ペバシズマブ                                                                 | 5         | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血            |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸04    | FOLFIRI+パニツムマブ | パニツムマブ                                                                 | 6         | mg/kg    | 60分                          | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症            |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸05    | FOLFIRI+ラムシルマブ | ラムシルマブ                                                                 | 8         | mg/kg    | 30分<br>(初回 60分)              | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白   |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸06    | FOLFOX         | オキサリプラチン                                                               | 85        | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群                                             |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸07    | FOLFOX+BV      | ペバシズマブ                                                                 | 5         | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | オキサリプラチン                                                               | 85        | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血            |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸08    | FOLFOX+パニツムマブ  | パニツムマブ                                                                 | 6         | mg/kg    | 60分                          | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | オキサリプラチン                                                               | 85        | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 400       | mg/㎡     | 全開                           | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400      | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症            |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸09    | FOLFOXIRI      | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | オキサリプラチン                                                               | 85        | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400～3200 | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群                                  |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸10    | FOLFOXIRI+ B V | ペバシズマブ                                                                 | 5         | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴    | Day1    | 14日 |
|         |                | イリノテカン                                                                 | 150       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | オキサリプラチン                                                               | 85        | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | レボホリナート                                                                | 200       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |
|         |                | 5-FU                                                                   | 2400～3200 | mg/㎡     | 46時間                         | 持続    | Day1-3  |     |
|         |                | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、下痢、骨髄抑制、脱毛、口内炎、手足症候群、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血 |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸11    | IRIS+ B V      | ペバシズマブ                                                                 | 5         | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴    | Day1、15 | 28日 |
|         |                | イリノテカン                                                                 | 125       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1、15 |     |
|         |                | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                                                   | 80        | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服    | Day1～14 |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血       |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸12    | IRIS           | イリノテカン                                                                 | 125       | mg/㎡     | 90分                          | 点滴    | Day1、15 | 28日 |
|         |                | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                                                   | 80        | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服    | Day1～14 |     |
|         |                | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、脱毛、皮膚障害、悪心・嘔吐、                                       |           |          |                              |       |         |     |
| 大腸13    | SOX+ B V       | ペバシズマブ                                                                 | 7.5       | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴    | Day1    | 21日 |
|         |                | オキサリプラチン                                                               | 130       | mg/㎡     | 120分                         | 点滴    | Day1    |     |

|      |                              |                                                                                               |                 |          |                              |    |             |     |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----|-------------|-----|
|      |                              | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                                                                          | 80              | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、皮膚障害、悪心・嘔吐、過敏症、末梢神経障害、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                      |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸14 | XELOX+ B V                   | ペバシズマブ                                                                                        | 7.5             | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴 | Day1        | 21日 |
|      |                              | オキサリプラチン                                                                                      | 130             | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | カベシタピン                                                                                        | 2000            | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、過敏症、末梢神経障害、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                        |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸15 | XELOX                        | オキサリプラチン                                                                                      | 130             | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        | 21日 |
|      |                              | カベシタピン                                                                                        | 2000            | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、過敏症、末梢神経障害                                                         |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸16 | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾟﾝ+BV                  | ペバシズマブ                                                                                        | 7.5             | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴 | Day1        | 21日 |
|      |                              | カベシタピン                                                                                        | 2000            | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：手足症候群、下痢、悪心・口内炎、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                                        |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸17 | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾟﾝ+IRI+BV              | ペバシズマブ                                                                                        | 7.5             | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴 | Day1        | 21日 |
|      |                              | イリノテカン                                                                                        | 200             | mg/㎡     | 90分                          | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | カベシタピン                                                                                        | 1600            | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、脱毛、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                                |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸18 | ﾊﾆﾂﾑﾏﾌﾞ                      | パニツムマブ                                                                                        | 6               | mg/kg    | 60分                          | 点滴 | Day1        | 14日 |
|      |                              | 主な副作用：infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症                                                        |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸19 | ﾍﾞｷｼﾏﾌﾞ +ｲﾝｺﾗﾌｴﾆﾌﾞ +ﾋﾞﾆﾌｴﾆﾌﾞ | ﾍﾞｷｼﾏﾌﾞ                                                                                       | 250<br>(初回 400) | mg/㎡     | 60分<br>(初回 120分)             | 点滴 | Day1        | 7日  |
|      |                              | ｲﾝｺﾗﾌｴﾆﾌﾞ                                                                                     | 300             | mg/day   | 1日1回                         | 内服 | Day1ー7      |     |
|      |                              | ﾋﾞﾆﾌｴﾆﾌﾞ                                                                                      | 90              | mg/day   | 1日2回                         | 内服 | Day1ー7      |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、悪心・嘔吐、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症、皮膚悪性腫瘍、手掌・足底発赤知覚不全症候群、眼症状、心機能障害、横紋筋融解症、高血圧、出血 |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸20 | ﾍﾞｷｼﾏﾌﾞ +ｲﾝｺﾗﾌｴﾆﾌﾞ           | ﾍﾞｷｼﾏﾌﾞ                                                                                       | 250<br>(初回 400) | mg/㎡     | 60分<br>(初回 120分)             | 点滴 | Day1        | 7日  |
|      |                              | ｲﾝｺﾗﾌｴﾆﾌﾞ                                                                                     | 300             | mg/day   | 1日1回                         | 内服 | Day1ー7      |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、悪心・嘔吐、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症、皮膚悪性腫瘍、手掌・足底発赤知覚不全症候群、眼症状                     |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸21 | CPT-11+ﾊﾆﾂﾑﾏﾌﾞ               | ﾊﾆﾂﾑﾏﾌﾞ                                                                                       | 6               | mg/kg    | 60分                          | 点滴 | Day1        | 14日 |
|      |                              | イリノテカン                                                                                        | 150             | mg/㎡     | 90分                          | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、骨髄抑制、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症                                                |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸22 | sLV5FU2+ペバシズマブ               | ペバシズマブ                                                                                        | 5               | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴 | Day1        | 14日 |
|      |                              | レボホリナート                                                                                       | 200             | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | 5-FU                                                                                          | 400             | mg/㎡     | 全開                           | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | 5-FU                                                                                          | 2400            | mg/㎡     | 46時間                         | 持続 | Day1        |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、口内炎、骨髄抑制、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                                            |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸23 | TAS-102+BV                   | ペバシズマブ                                                                                        | 5               | mg/kg    | 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | 点滴 | Day1、15     | 28日 |
|      |                              | トリフルリジン・チピラシル                                                                                 | 70              | mg/㎡/day | 1日2回                         | 内服 | Day1ー5、8ー12 |     |
|      |                              | 主な副作用：骨髄抑制、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血                                                   |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸24 | ﾍﾞﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ 3週間             | ﾍﾞﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ                                                                                  | 200             | mg/body  | 30分                          | 点滴 | Day1        | 21日 |
|      |                              | 主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、Ⅰ型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症                                                 |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸25 | ﾊﾆﾂﾑﾏﾌﾞ+ソトラシブ                | ﾊﾆﾂﾑﾏﾌﾞ                                                                                       | 6               | mg/kg    | 60分                          | 点滴 | Day1        | 14日 |
|      |                              | ソトラシブ                                                                                         | 960             | mg       | 1日1回                         | 内服 | Day1ー14     |     |
|      |                              | 主な副作用：下痢、肝機能障害、間質性肺炎、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症                                         |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸26 | FOLFOX+ﾍﾞｷｼﾏﾌﾞ +ｲﾝｺﾗﾌｴﾆﾌﾞ    | エンコラフェニブ                                                                                      | 300             | mg/day   | 1日1回                         | 内服 | Day1ー14     | 14日 |
|      |                              | セツキシマブ                                                                                        | 500             | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | オキサリプラチン                                                                                      | 85              | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | レボホリナート                                                                                       | 200             | mg/㎡     | 120分                         | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | 5-FU                                                                                          | 400             | mg/㎡     | 全開                           | 点滴 | Day1        |     |
|      |                              | 5-FU                                                                                          | 2400            | mg/㎡     | 46時間                         | 持続 | Day1-3      |     |
|      |                              | 主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、下痢、悪心・嘔吐、infusion reaction、皮膚症状、低マグネシウム血症、皮膚悪性腫瘍、手掌・足底発赤知覚不全症候群、眼症状      |                 |          |                              |    |             |     |
| 大腸27 | ﾚﾌﾌﾗﾝｸﾞﾘﾌﾞ +weekly PTX+CBDCA | レチファンリマブ                                                                                      | 500             | mg/body  | 30分                          | 点滴 | Day1        | 28日 |
|      |                              | バクリタキセル                                                                                       | 80              | mg/㎡     | 60分                          | 点滴 | Day1、8、15   |     |
|      |                              | カルボプラチン                                                                                       | 5               | AUC      | 30分                          | 点滴 | Day1        |     |

|  |  |                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  | 主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、Ⅰ型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症、アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|