レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
食道01	**FP**	5-FU	800	mg/㎡	24時間	点滴	Day1－5	28日 （術前 21日）
		シスプラチン	80	mg/㎡	2時間	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害						
食道02	**FP+RT**	5-FU	700～1000	mg/㎡	24時間	点滴	Day1－4	28日
		シスプラチン	70～75	mg/㎡	2時間	点滴	Day1	
		＊放射線治療は、総線量50.4～60Gyを分割（Day 1－5、Day 8－12、Day 15－19、Day 22－26、Day 29－33、Day 36-38）						
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、嚥下障害、粘膜炎、皮膚障害						
食道03	**weekly PTX**	パクリタキセル	100	mg/㎡	60分	点滴	Day1、8、15、22、29、36	49日
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、関節痛・筋肉痛、脱毛						
食道04	**DTX**	ドセタキセル	70	mg/㎡	60分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛						
食道05	**FP+ペムブロリズマブ**	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		5-FU	800	mg/㎡	24時間	点滴	Day1－5	
		シスプラチン	80	mg/㎡	2時間	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
食道06	**FP+ニボルマブ**	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日
		5-FU	800	mg/㎡	24時間	点滴	Day1－5	
		シスプラチン	80	mg/㎡	2時間	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、口内炎、腎障害、神経障害、間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
食道07	**ニボルマブ　2週間**	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
食道08	**ニボルマブ　4週間**	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
食道09	**DCF**	5-FU	750	mg/㎡	24時間	点滴	Day1－5	21日
		ドセタキセル	70	mg/㎡	60分	点滴	Day1	
		シスプラチン	70	mg/㎡	2時間	点滴	Day1	
		主な副作用：骨髄抑制、悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、脱毛、粘膜炎						